



16 במרץ, 2020

לעמיתים שלום רב,

הנדון: הנחיות איל"ה והאיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה  
לגבי הדבקת COVID 19 למטופלות פריון (גרסה מס' 1)

הקורונה (COVID 19) הינו וירוס מסוג RNA המוכר כבר שנים רבות כגורם בד"כ לתחלואה נשימתית קלה בדומה למחלת השפעת. עד כה ידוע על פחות מ-20 נשים הריוניות שנדבקו בוירוס וזאת למרות שהיה מצופה למספרים גבוהים יותר, עקב השינויים הפיזיולוגיים שמערבים את מערכת הנשימה בהריון. ככלל, נשים בהריון נמצאות בקבוצת סיכון למחלות ויראליות כגון השפעת העונתית ודומיה ועליהן לנקוט משנה זהירות, כדי לא לסכן את עצמן ואת העובר.

עדיין אין מספיק מידע מבוסס על סיבוכים לטווח רחוק שיכול להביא עמו וירוס הקורונה. מהמידע על ההתפרצויות הקודמות של שפעת החזירים והסארס (שדומות במאפייניהן לקורונה) אנו יודעים על שיעור מעט יותר גבוה של הפלות טבעיות ושיעור גבוה יותר של לידות מוקדמות, הפרעה בגדילה התוך רחמית ואף מוות עוברי תוך רחמי במקרים חריגים. יחד עם זאת, הוירוס קרוב לוודאי אינו עובר במהלך ההריון דרך השלייה וכי לא נמצאו עקבות שלו במי השפיר (נספח מס' 1), כמוכן אין עדות להעברתו בדרכי הרבייה (נספח מס' 1).

1. יש לידע את המטופלות והמטופלים שהמידע המובא במסמך זה נכון לשעה זאת ועשוי להשתנות בעתיד.

2. המלצתנו היא כי בשלב זה אין מקום לעצירה גורפת של טיפולי הפוריות. הוראות אלו יתעדכנו מעת לעת ע"פ הספרות הרפואית והנחיית משרד הבריאות.

יחד עם זאת:

3. אין להתחיל טיפולי פריון כלשהם כאשר מי מבני הזוג חולה, חשוד כחולה או קיימת לגביו הוראת בידוד (ראה הגדרות חוזר משרד הבריאות (נספח מס' 2+3).

4. ניתן להתחיל טיפול באישה / זוג בריאים אשר אינם עונים על ההגדרה המפורטת בסעיף ובנספחיה, בכפוף לידוע ותייעוד כאמור בסעיפים 1-2. יש להדגיש שהטיפול עשוי להתבטל בהתאם למצבם הבריאותי או להוראות משרד הבריאות. יש להנחות את המטופלות כי בכל מקרה שמופיעים תסמינים כגון: חום הגבוה מ 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר אין להגיע למתקן הרפואי שבו היא מטופלת. במקרים אלו יש לפנות למד"א.

5. במידה והופיעה מחלה או חשד קליני להדבקה, או הוראת בידוד למטופלת או לבן זוגה אחרי התחלת הטיפול יש לבטלו. במקרים בהם המצב הנ"ל נוצר בעת גירוי שחלתי מתקדם בסמוך לשאיבת ביציות, אשר לא ניתן לביטול בהיבט הכמותי, אפשר לבצע את השאיבה, אך אין לקיים העברת ביציות מופרות לרחם. הביציות הנשאבות בנסיבות אלו (מופרות או בלתי מופרות) יש להקפאן במיכל נפרד וחל איסור להשתמש בהן בשלב זה.

<https://www.asrm.org/news-and-publications/news-and-research/press-releases-and-bulletins/covid-19-suggestions-on-managing-patients-who-are-undergoing-infertility-therapy-or-desiring-pregnancy>

<https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb>



**Israel Society of Obstetrics and Gynecology**

\*\*\*\*\*

6. במהלך כל הטיפול יש להעניק למטופלת, לצוות המטפל, לסביבה הטיפולית מענה ומיגון הולמים לאפשרות של הדבקה בנגיף, תחלואה וצורך בבידוד.

7. יש לקיים את כלל ההנחיות העדכניות של משרד הבריאות והאיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה במהלך הטיפול, לרבות אלו המתייחסות למיגון, הגבלת שהות מטופלים / לות בחלל ובזמן מסוים (\*).

הננו להבהיר כי לעת הזאת יש להגיע ללא מלויים, למנוע התקהלות של מספר מטופלות יחד בזמן לקיחת בדיקות דם, בדיקות אולטראסאונד וכן בזמן ההמתנה במרפאות.

פרופ' אדריאן שולמן,  
יו"ר איל"ה

פרופ' רוני מימון,  
יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

הוכן נדון ואשר ע"י ועדת נירות עמדה של איל"ה ב 15/03/2020

פרופ' ב. פיש יו"ר, ד"ר י. שופרו מזכיר  
חברים: פרופ' ע. בן עמי, ד"ר א. קלדרון, ד"ר א. כהנא, פרופ' א. וייסמן, פרופ' ר. רונאל,  
פרופ' מ/ק א. אלנבוגן, פרופ' ר. אורבייטו, פרופ' מ/ק ע. שלום פז, פרופ' ט. אלדר גבע

\*שילוט למבקרים במוסדות רפואיים:  
יש להציב בעברית, ערבית, רוסית ואמהרית

**מבקר/ת יקר/ה,**

אם יש לך מחלת חום או שיעול או קושי בנשימה, ושהית ב- 14

הימים האחרונים בחו"ל, בבית לחם, בית ג'אלה או בית סחור.

אם היית במגע עם חולה שאובחן עם נגיף הקורונה החדש

Novel Coronavirus 2019

מבקשים להודיע על כך מייד למשרד, לאחיות או לרופאי היחידה.

בנוסף מבקשים להקפיד על מסכת פה-אף כירורגית כאמצעי זהירות